

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE

Brufen Antinfiammatorio locale 5% gel Etofenamato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 1-2 settimane.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Brufen Antinfiammatorio locale e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Brufen Antinfiammatorio locale
3. Come usare Brufen Antinfiammatorio locale
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Brufen Antinfiammatorio locale
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Brufen Antinfiammatorio locale e a cosa serve

Brufen Antinfiammatorio locale 5% gel è un medicinale a base di etofenamato, un antinfiammatorio ad uso locale.

Brufen Antinfiammatorio locale è indicato negli **adulti**:

- nel trattamento locale del dolore e dell'infiammazione di articolazioni, muscoli, tendini e legamenti.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 1-2 settimane.

2. Cosa deve sapere prima di usare Brufen Antinfiammatorio locale

Non usi Brufen Antinfiammatorio locale

- se è allergico a etofenamato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- se è allergico all'acido flufenamico o ad altri medicinali antinfiammatori non steroidei (FANS).
- se è nel terzo trimestre di gravidanza.

- se sta allattando con latte materno.
- se ha meno di 18 anni.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Brufen Antinfiammatorio locale.

Eviti di applicare Brufen Antinfiammatorio locale 5% gel:

- sulle ferite aperte
- sulla pelle infiammata che si presenta con macchie rosse, prurito.

Eviti il contatto di Brufen Antinfiammatorio locale 5% gel:

- con gli occhi e le mucose (es della bocca, del naso).

Deve lavarsi le mani dopo l'applicazione del prodotto e deve evitare il contatto con queste parti del corpo.

Non esponga l'area trattata al sole e/o al solarium durante il trattamento e per le due settimane successive.

Se è affetto da asma, malattie ostruttive croniche dell'apparato respiratorio, febbre da fieno o gonfiore cronico delle mucose nasali (cosiddetti polipi nasali) o malattie croniche ostruttive delle vie aeree o infezioni croniche delle vie aeree, soprattutto se combinate con manifestazioni di febbre da fieno, utilizzi Brufen Antinfiammatorio locale solo dopo aver preso alcune precauzioni e sotto stretto controllo medico.

I bambini non devono entrare in contatto con le zone della pelle trattate con il medicinale.

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti da applicare sulla pelle può dare origine ad allergie. In tal caso interrompa il trattamento e chiedi consiglio al medico (vedere paragrafo "Possibili effetti indesiderati").

Non assuma questo medicinale per via orale.

Se in passato ha manifestato allergie, usi Brufen Antinfiammatorio locale con la dovuta cautela.

Bambini e adolescenti

L'uso nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni non è raccomandato, in quanto sicurezza ed efficacia non sono state stabilite.

Altri medicinali e Brufen Antinfiammatorio locale

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Questo medicinale deve essere utilizzato nel primo e nel secondo trimestre di gravidanza dopo aver accuratamente valutato il rapporto rischio/beneficio.

Questo medicinale è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento con latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Brufen Antinfiammatorio locale non influisce sulla capacità di guidare veicoli e usare macchinari.

3. Come usare Brufen Antinfiammatorio locale

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 2-3 applicazioni al giorno, in corrispondenza della zona colpita.

Come usare Brufen Antinfiammatorio locale:

- applichi un leggero strato di gel (una striscia di 5-10 cm) sulla zona interessata
- massaggi lievemente per favorire l'assorbimento del gel.

Durata del trattamento

Solitamente è sufficiente un trattamento di 1-2 settimane.

Se dopo tale periodo i sintomi persistono, si rivolga al medico che valuterà se proseguire il trattamento con questo medicinale o cambiare terapia.

Se usa più Brufen Antinfiammatorio locale di quanto deve

In caso usi accidentalmente elevate quantità di medicinale, si rivolga al medico o raggiunga l'ospedale più vicino.

Se usa dosi eccessive di questo medicinale ad esempio, applica il contenuto di un tubetto o più di gel sull'intera superficie del corpo in un breve periodo di tempo, possono comparire effetti indesiderati quali:

- mal di testa
- stordimento
- malessere alla bocca dello stomaco

In questi casi rimuova il prodotto con acqua e contatti il medico.

Se dimentica di usare Brufen Antinfiammatorio locale

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Durante il trattamento con Brufen Antinfiammatorio locale, specie se prolungato, così come con altri prodotti ad uso locale potrebbe manifestare allergia. In tal caso **INTERROMPA** il trattamento e chiedi consiglio al medico.

Inoltre sono stati osservati e riportati i seguenti effetti indesiderati la cui frequenza non può essere stabilita:

Effetti che riguardano la pelle

- arrossamento della pelle
- irritazione
- prurito
- eruzione della pelle (rash)
- gonfiore (edema)
- formazione di vescicole sulla pelle

I possibili effetti indesiderati riportati sopra si verificano generalmente in corrispondenza della pelle trattata e scompaiono se l'applicazione della crema viene sospesa

- infiammazione della pelle (dermatite allergica da contatto)
- arrossamento della pelle con comparsa di pomfi e prurito (orticaria)
- rigonfiamento diffuso della pelle

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo:

www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Brufen Antinfiammatorio locale

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Brufen Antinfiammatorio locale

- il principio attivo è etofenamato (1 g di gel contiene 50 mg di etofenamato)
- gli altri componenti sono: alcol oleilcetilico poliglicoletere, macrogol 400, carbomero, alcol isopropilico, idrossido di sodio, acqua depurata

Descrizione dell'aspetto di Brufen Antinfiammatorio locale e contenuto della confezione

Brufen Antinfiammatorio locale 5 % gel si presenta in tubo da 40 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Meda Pharma S.p.A.,
Via Felice Casati, 20 – 20124 MILANO

Produttore

Meda Manufacturing GmbH,
Neurather Ring 1
51063 Colonia
Germania

Madaus GmbH
Lütticher Straße 5
53842 Troisdorf
Germany

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato in aprile 2019